


Schwerbehinderung und Berentung bei Lymphabflussstörungen



W.Schneider
Baumrainklinik
„Haus am Schloßpark“
Bad Berleburg
Fachklinik für Lymphologie und Ödemerkrankungen
Praxis für Lymphologie und Gefäßerkrankungen

Behinderungsgrad

Ödem

Lymphödeme

10 %	eine Extremität leichtgradig ödematisiert (Arm oder Bein),
20 %	wenn am Führungsarm
30 %	eine Extremität schwergradig ödematisiert (Arm oder Bein) mit geringer Leistungseinschränkung,
40 %	wenn am Führungsarm
20 %	zwei Extremitäten leichtgradig ödematisiert (Arm oder Bein)
40-60 %	zwei Extremitäten schwergradig ödematisiert mit geringer Leistungseinschränkung
40-70 %	eine Extremität schwergradig ödematisiert mit erheblicher Leistungseinschränkung,
60-80 %	wenn am Führungsarm
80-100 %	zwei Extremitäten schwergradig ödematisiert mit erheblicher Leistungseinschränkung
10 %	Kopflymphödem geringgradig (wenig störend)
20-30 %	Kopflymphödem mäßiggradig
50 %	Kopflymphödem massiv (abstoßend wirkend)
100 %	Kopflymphödem massiv mit erheblicher Sprech- und Schluckstörung

Phlebödem

10 %	eine Extremität leichtgradig ödematisiert
20-30 %	eine Extremität leichtgradig ödematisiert mit chronischem Ulcus cruris
30 %	eine Extremität schwergradig ödematisiert mit geringer Leistungseinschränkung
30-40 %	eine Extremität schwergradig ödematisiert mit chronischem Ulcus cruris
20 %	zwei Extremitäten leichtgradig ödematisiert.
30-40 %	zwei Extremitäten leichtgradig ödematisiert mit Ulcus einseitig
40-50 %	zwei Extremitäten leichtgradig ödematisiert mit Ulcus beidseits
40-60 %	zwei Extremitäten schwergradig ödematisiert mit geringer Leistungseinschränkung
50-70 %	zwei Extremitäten schwergradig ödematisiert mit chronischem Ulcus cruris einseitig
60-80 %	zwei Extremitäten schwergradig ödematisiert mit chronischem Ulcus cruris beidseits

Lipödeme

10 %	zwei Extremitäten leichtgradig verdickt
10-20 %	vier Extremitäten leichtgradig verdickt
20-50 %	zwei Extremitäten schwergradig verdickt mit geringer Leistungseinschränkung
60-80 %	vier Extremitäten schwergradig verdickt mit geringer Leistungseinschränkung

Lähmungsödem

80 %	eine Extremität schwergradig ödematisiert mit Gebrauchsunfähigkeit,
100 %	wenn am Führungsarm
100 %	zwei Extremitäten schwergradig ödematisiert

Keine Minderung
Der Erwerbsfähigkeit

orthostatisches Ödem
idiopathisches Ödem
diuretika-induziertes Ödem
medikamentös-bedingtes Ödem



Kongress 2007

31. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie

Homepage
Aktuelles
Stand
Anmeldung
Mitgliedskreise
Beitrag werden
Mitglieder
Schrift
Kongress 2007
Anstaltungen
Visiten
Lymphologische Infos
Lymphkliniken
Adressenliste
Therapeutenliste
Bildungsrichtlinien
Bildungsstätten
Links
Resümee



www.dglymp.de

Thema:
AKTUELLES, BEWÄHRTES UND ZUKÜNFTIGES IN DIAGNOSTIK UND THERAPIE
LYMPHOLOGISCHER ERKRANKUNGEN

20. bis 22. September 2007
Philipps-Universität Marburg

